

Regard
santél'aire de
Hornoy-le-Bourg

→ Présentation de l'aire

L'aire d'Hornoy-le-Bourg comprend **un seul canton** éponyme.

Au 1^{er} janvier 2006, cette aire compte 5 691 habitants, soit une densité de 37,5 habitants au km². Cette densité est plus faible que celles de la Somme (91,5 h/km²), de la Picardie (97,6 h/km²) et de la France métropolitaine (112,9 h/km²).

Cette aire compte davantage de personnes de **75 ans et plus** que dans les moyennes départementale, régionale et nationale : 8,7 % de la population de l'aire, contre 7,3 % dans la Somme, 6,6 % en Picardie et 7,7 % en France métropolitaine.


Parallèlement, les **moins de 25 ans** représentent 30,6 % de la population de l'aire, ce qui est plus faible que dans le département (32,7%) et la région (33,1 %), mais équivalent au niveau national (30,9 %).

Entre 2003 et 2006, l'aire d'Hornoy-le-Bourg présente un **indice conjoncturel de fécondité (ICF)** de 2,56 enfants par femme, ce qui est plus élevé que dans le département (1,82), la région (2,00) et qu'au niveau national (1,90).

En tout, ce sont 271 naissances domiciliées entre 2003 et 2006, dont 11,1 pour 1 000 sont le fait de **mères mineures** (contre 10,2 ‰ dans la Somme, 9,6 ‰ en Picardie et 5,7 ‰ en France métropolitaine).

Entre 2001 et 2004, sur les 253 naissances dont la mère réside dans l'aire, 82,2 % se sont passées à Amiens et 17,4 % à Abbeville.

Sur cette même période, les 343 décès concernant les habitants de l'aire sont constatés à Boves pour 49,0 % d'entre eux, à Amiens pour 37,9 % et à Abbeville pour 4,4 % d'entre eux.



SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S

l'Assurance
MaladieService Médical
Nord Pas-de-Calais Picardie

Urcam

→ Données sociales


Davantage d'APA à domicile mais moins de bénéficiaires de l'aide ménagère

Un peu plus de la moitié des foyers fiscaux de l'aire est **non imposable** en 2005 (55,4 %), ce qui est plus que dans la Somme (50,8 %), la Picardie (47,8 %) et la France métropolitaine (46,2 %).

Les habitants de l'aire ont un **revenu moyen** de 13 936 € en 2005, ce qui est inférieur à ceux du département (15 076 €), de la région (15 938 €) et du niveau national (17 165 €).

L'aire d'Hornoy-le-Bourg compte 9,2 bénéficiaires de l'**aide ménagère** pour 1 000 personnes de 65 ans et plus en 2004, ce qui est inférieur aux moyennes de référence (20,5 ‰ dans la Somme, 21,3 ‰ en Picardie).

Ceci est en décalage avec le fait que l'aire étudiée compte davantage de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie** (APA) à domicile (414,0 bénéficiaires pour 1 000 personnes de 75 ans et plus en 2005) que la Somme (153,0 ‰), la Picardie (117,7 ‰) et la France métropolitaine (149,4 ‰).



En 2004, l'aire d'Hornoy-le-Bourg compte 216 **demandeurs d'emploi en fin de mois** (DEFM) de catégorie 1. Les DEFM de l'aire sont 29,6 % à avoir moins de 25 ans (25,9 % dans le département et 24,8 % en région), 15,7 % à avoir 50 ans et plus (contre 12,0 % et 13,6 %).


En outre, la proportion de DEFM de plus d'un an d'ancienneté (33,8 %) est aussi importante que dans la Somme (33,2 %) et la Picardie (33,9 %).

L'aire compte moins d'allocataires du **revenu minimum d'insertion** (RMI) que les entités géographiques de référence : 39,4 allocataires pour 1 000 ménages en 2004, contre 49,5 ‰ dans la Somme, 42,3 ‰ en Picardie et 41,9 ‰ en France métropolitaine.

Les taux d'allocataires du RMI pour des familles monoparentales ou des couples sont plus bas dans l'aire (respectivement 89,3 pour 1 000 familles monoparentales et 14,6 pour 1 000 couples en 2004) que dans la Somme (147,2 ‰ et 17,8 ‰) et qu'en Picardie pour les familles monoparentales (133,4 ‰ et 14,5 ‰).

Par ailleurs, on compte 33,6 Rmistés de 25-49 ans pour 1 000 personnes de cette tranche d'âge dans l'aire, contre 41,3 ‰ dans la Somme et 33,4 ‰ en Picardie.

2



La **couverture maladie universelle (CMU) de base** concerne 21,9 bénéficiaires pour 1 000 habitants en 2005, contre 24,9 ‰ dans la Somme, 16,1 ‰ en Picardie et 22,1 ‰ en France métropolitaine.

Pour la **CMU complémentaire**, l'aire se situe (81,8 pour 1 000 habitants en 2005), en-dessous des références départementale (105,1 ‰) et régionale (89,6 ‰).

→ Professionnels de santé

Une densité de généralistes élevée

En novembre 2006, l'aire d'Hornoy-le-Bourg compte 8 **médecins généralistes**, soit une densité de 13,9 généralistes pour 10 000 habitants. Cette densité est plus élevée que celles de la Somme (12,0), de la Picardie (9,7) et de la France métropolitaine (11,2).

Parmi les généralistes de l'aire, 25% sont des femmes, ce qui est moins élevé que dans les entités de référence : 28,6% dans le département, 27,6% en région et 29,4% au niveau national.

La moyenne d'âge de ces généralistes est de 45,0 ans, ce qui est inférieur à celles de la Somme (48,0 ans), de la Picardie (49,4 ans) et de la France métropolitaine (49,8 ans).

Deux d'entre eux ont par ailleurs 55 ans et plus, soit 25% de l'effectif de l'aire (28,8% dans la Somme, 31,5% en Picardie et 32,3% en France métropolitaine).

L'aire ne compte aucun **médecin spécialiste**.

Au 31 décembre 2007, 1 **chirurgien dentiste** (1 homme de 51 ans) est installé dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg, soit une densité de 1,7 chirurgien dentiste libéral et mixte pour 10 000 habitants contre 3,6 dans la Somme, 4,0 en Picardie et 6,2 en France métropolitaine.

Les **auxiliaires médicaux** (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes) sont 10 dans l'aire en avril 2007. La densité est de 17,4 auxiliaires médicaux libéraux et salariés pour 10 000 habitants, ce qui est plus important que dans la Somme (16,0) et la Picardie (13,8) mais moins élevé qu'en France métropolitaine (21,9).

Une grande partie des auxiliaires médicaux de l'aire sont des femmes (80,0%), ce qui est plus important que dans les entités géographiques de référence (entre 69 et 72%).


La moyenne d'âge est de 42,1 ans (contre 42,9 ans dans la Somme, 43,5 ans en Picardie et 43,6 ans en France métropolitaine) et 2 auxiliaires médicaux ont 55 ans et plus, soit 20,0% de l'effectif.

L'aire d'Hornoy-le-Bourg a une densité de 10,4 **infirmiers** libéraux et mixtes pour 10 000 habitants en avril 2007 (soit 6 infirmiers), ce qui est supérieur à la Somme et à la Picardie (respectivement 8,2 et 7,1) mais inférieur à la France métropolitaine (11,2).


Il n'y a que des femmes infirmières dans l'aire.

Leur moyenne d'âge est de 39,0 ans (45,2 ans dans la Somme, 44,6 ans en Picardie et 44,9 ans en France métropolitaine) et toutes ont moins de 55 ans.

On recense 2 **pharmacies** dans l'aire en 2004, soit une densité de 3,6 pharmacies pour 10 000 habitants. Cette densité est proche de celle de la Somme (3,5) et légèrement supérieure à celle de la Picardie (3,3).



Sources : Adeli, Insee, OR2S



Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 62,0% des patients ayant consulté un médecin généraliste l'ont fait au sein de l'aire d'Hornoy-le-Bourg. Le second lieu de consultations est l'aire d'Amiens (7,0%).


En revanche, concernant les autres professionnels de santé tels que ophtalmologues, gynécologues et dermatologues, l'aire étant dépourvue de ces spécialistes, les habitants se tournent principalement vers Amiens (77,8% des consultations en gynécologie obstétrique, 82,7% pour la gynécologie médicale et 63,8% pour la dermatologie). Abbeville (16,3% pour la gynécologie obstétrique et 12,2% pour la dermatologie) et Eu (12,8% pour la dermatologie) représentent à moindre niveau des pôles d'attractions. Pour l'ophtalmologie, les lieux de consultations privilégiés sont Aumale (41,7%) et Amiens (26,9%).

→ Mortalité et ALD

Une mortalité générale et prématurée plus faible

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg est de 77,6 ans pour les hommes et de 82,1 ans pour les femmes. Ces espérances de vie sont supérieures à celles du département (respectivement 73,9 ans et 81,6 ans) et de la région (74,1 ans et 81,7 ans), notamment pour les hommes.

Lorsque l'on compare avec la France métropolitaine (75,9 ans et 83,2 ans), on observe que les hommes de l'aire d'Hornoy-le-Bourg ont 1,7 année de vie en plus. À l'inverse, les femmes perdent 1 an de vie.



En 2000-2004, l'aire d'Hornoy-le-Bourg connaît une **mortalité générale** de 893,8 pour 100 000 habitants, soit 53 décès par an. Cette mortalité est plus faible que dans la Somme (1 055,8), la Picardie (1 052,7) et la France métropolitaine (911,3).

De même, la **mortalité prématurée** (survenant avant 65 ans) est plus faible dans l'aire (191,4 pour 100 000) que dans la Somme (275,9), la Picardie (262,7) et la France métropolitaine (221,5).

Plus de la moitié des décès (56,7 %) survenant dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg en 2000-2004 sont le fait de tumeurs et de maladies de l'appareil circulatoire (60,1 % des décès masculins et 52,5 % des décès féminins).

Les **tumeurs** sont responsables de 35,0 % des décès masculins et 26,7 % des décès féminins. Au deuxième rang des causes de mortalité, les maladies de l'**appareil circulatoire** ont occasionné 25,2 % des décès masculins et 25,8 % des décès féminins.

En troisième position, les causes de mortalité diffèrent selon le sexe. Chez les femmes, ce sont les **causes externes** de mortalité (comprenant les accidents et suicides) qui comptent pour 8,3 % de l'ensemble de leurs décès. Chez les hommes, 7,7 % des décès sont le fait de maladies de l'appareil respiratoire.

L'aire d'Hornoy-le-Bourg affiche un taux de mortalité par **suicide** plus élevé qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (25,7 pour 100 000 contre respectivement 23,1 et 18,0) mais plus faible que dans la Somme (26,7).

Les **accidents de la circulation** engendrent une mortalité supérieure au taux national (12,3 pour 100 000 contre 10,8) mais inférieure aux taux départemental (13,0) et régional (14,3).

En 2004-2005, 1 712 **séjours hospitaliers** ont été comptabilisés pour des habitants de l'aire d'Hornoy-le-Bourg en moyenne par an, soit un taux de 298,5 séjours pour 1 000 habitants (contre 273,9 % dans la Somme et 289,3 % en Picardie).

Concernant les nouvelles **admissions en affections de longue durée** (ALD) en 2004-2005, les tumeurs et le diabète sont les deux principales causes d'admissions dans l'aire, pour les femmes comme pour les hommes. À elles deux, elles représentent 37 % des nouvelles admissions.

Le diabète fait partie des maladies qui induisent à terme d'autres affections telles que les maladies cardiovasculaires, neurologiques, ophtalmologiques et/ou rénales. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

Le taux d'admissions en ALD de l'aire pour **diabète** compliqué (18 nouveaux cas en moyenne par an 2004 et 2005), est de 313,8 pour 100 000 habitants, contre 284,7 dans la Somme, 311,4 en Picardie et 266,5 en France métropolitaine.

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Diabète	9	18,0	1	9	13,0	2
Tumeurs malignes	8	15,2	2	18	27,0	1
Hypertension artérielle sévère	5	10,1	3	5	7,9	5
Accident vasculaire cérébral	5	8,6	4	2	2,5	9
Maladie coronaire	5	8,5	5	5	8,1	4
Maladie d'Alzheimer et autres démences	4	7,6	6	2	3,5	8
Pathologies cardiaques graves	3	6,4	7	7	10,4	3
Affections psychiatriques de longue durée	3	6,0	8	1	2,2	11
Artériopathies chroniques	3	5,3	9	3	5,0	7
Insuffisance respiratoire chronique	2	3,3	10	4	6,4	6
Forme grave des affections neurologiques	1	1,8	11	2	2,2	10
Autres causes de nouvelles admissions	5	9,1	-	8	11,8	-
Total	53	100		67	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Des admissions en ALD plus fortes pour les pathologies cardiaques graves, les maladies coronaires et l'hypertension artérielle

Les **maladies de l'appareil circulatoire** ont entraîné 43 nouvelles admissions en affection de longue durée (ALD) en moyenne par an entre 2004 et 2005, se répartissant en 23 admissions pour les hommes et 20 pour les femmes. Cela représente un taux de 732,2 pour 100 000 habitants contre 556,7 dans la Somme, 602,0 en Picardie et 586,1 en France métropolitaine.

En 2004-2005, 211 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an sont le fait de maladies cardiovasculaires, soit un taux de 35,0 pour 1 000 habitants (26,8 ‰ dans la Somme et 27,8 ‰ en Picardie).

La mortalité de l'aire d'Hornoy-le-Bourg pour ces pathologies est de 218,9 pour 100 000 en 2000-2004 (13 décès par an), ce qui est moins élevé que dans la Somme (316,6), la Picardie (314,2) et la France métropolitaine (271,8).


Les **cardiopathies ischémiques** ont entraîné 41 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an en 2004-2005, ce qui représente un taux de 6,7 pour 1 000 (5,4 ‰ dans la Somme et 6,1 ‰ en Picardie).

Parmi les maladies de l'appareil circulatoire, la mortalité par cardiopathies ischémiques (4 décès annuels en moyenne entre 2000 et 2004) est de 65,1 pour 100 000 dans l'aire, ce qui est moins important que dans la Somme (87,3), la Picardie (86,6) et la France métropolitaine (74,6).

Entre 2004 et 2005, 6 personnes de l'aire d'Hornoy-le-Bourg ont été admises en ALD suite à un **accident vasculaire cérébral** en moyenne par an (dont 4 femmes). Le taux d'admission en ALD dans l'aire est de 103,0 pour 100 000 contre 55,9 dans la Somme, 56,1 en Picardie et 60,5 en France métropolitaine.

En 2004-2005, 20 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an sont liés à des maladies cérébrovasculaires, soit un taux de séjour de 3,3 pour 1 000 (2,5 ‰ dans la Somme et 2,8 ‰ en Picardie).

La mortalité par maladies vasculaires cérébrales est inférieure dans l'aire (2 décès annuellement entre 2000 et 2004, soit un taux de mortalité de 27,3 pour 100 000) à celles de la Somme (67,8), de la Picardie (69,6) et de la France métropolitaine (63,4).



Les **pathologies cardiaques graves** ont suscité 10 nouvelles admissions en ALD en moyenne par an entre 2004 et 2005 (7 hommes et 3 femmes), soit un taux de 169,3 pour 100 000 habitants. Ce taux est plus important que dans les entités géographiques de référence (145,9 dans la Somme, 149,7 en Picardie et 140,1 en France métropolitaine).

La **maladie coronaire** représente un taux d'admissions en ALD de 178,7 pour 100 000 dans l'aire, ce qui est supérieur à ceux de la Somme (142,0), de la Picardie (150,0) et de la France métropolitaine (140,8).

Ce sont 10 nouvelles admissions en moyenne par an entre 2004 et 2005 (5 pour des femmes et 5 pour des hommes).

Les admissions en affection de longue durée pour **hypertension artérielle sévère** (174,4 pour 100 000) sont également plus fortes que dans les entités géographiques de référence (132,0 dans la Somme, 164,4 en Picardie et 170,2 en France métropolitaine).

On compte 10 nouveaux admis en ALD pour HTA sévère en moyenne par an en 2004-2005 dans l'aire, dont 5 hommes et 5 femmes.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Un taux d'admissions en ALD et une mortalité par tumeurs malignes inférieurs à la région

Le taux d'admissions en ALD pour **tumeurs malignes** dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg est de 461,1 pour 100 000 habitants (soit 26 personnes par an). Il est moins élevé que dans la Somme (489,7), la Picardie (497,8) et la France métropolitaine (483,1).

En 2004-2005, 124 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an sont liés à des tumeurs, soit un taux de 20,6 ‰ (22,3 ‰ dans la Somme et 24,3 ‰ en Picardie).

L'aire a un taux de mortalité de 269,2 décès pour 100 000 habitants en 2000-2004, soit 16 décès en moyenne par an (contre 288,0 dans le département, 286,6 en région et 257,8 au niveau national).




Les admissions en ALD pour le **cancer de la prostate** sont plus importantes dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg (244,3 pour 100 000 en 2004-2005) que dans la Somme (187,0), qu'en Picardie (209,5) et qu'en France métropolitaine (198,0).

Après 65 ans, ce taux passe à 928,7 contre respectivement 828,8 dans le département, 969,5 en région et 915,3 au niveau national.

Au total, ce sont 6 nouveaux admis en moyenne par an en 2004-2005, dont 3 ont 65 ans et plus.

Par ailleurs, le taux de séjours hospitaliers pour cancer de la prostate est de 4,5 ‰ en 2004-2005 (13 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an), contre 3,6 ‰ dans la Somme et 3,9 ‰ en Picardie.

La mortalité par cancer de la prostate (1 décès annuel) est moins forte dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg (34,5 pour 100 000 en 2000-2004) que dans la Somme (52,8), la Picardie (53,8) et la France métropolitaine (45,1).




En 2004-2005, 4 femmes (dont 3 de moins de 65 ans) de l'aire d'Hornoy-le-Bourg ont été admises annuellement pour la première fois en ALD au titre d'un **cancer du sein**. Ceci représente un taux d'admission inférieur aux entités géographiques de référence : 146,2 pour 100 000 contre 177,3 dans la Somme, 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine.

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer du sein est de 3,8 pour 1 000 habitantes de l'aire en 2004-2005 (soit 10 séjours en moyenne par an), contre 3,6 ‰ dans le département et 4,4 ‰ en région.

La mortalité est de 22,9 décès pour 100 000 en 2000-2004 dans l'aire, ce qui est moins important que dans la Somme (39,0), la Picardie (37,3) et la France métropolitaine (33,2). Ces cancers représentent 1 décès par an en moyenne.

La prévention reste tout de même particulièrement importante. En ce sens, le dépistage organisé vise à toucher l'ensemble de la population féminine de 50-74 ans afin de diminuer la mortalité.

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

Le **cancer colorectal** représente 3 admissions en ALD d'habitants de l'aire d'Hornoy-le-Bourg en moyenne par an en 2004-2005, dont 2 pour des hommes et 1 pour une femme. Le taux d'admission est de 39,5 pour 100 000 dans l'aire, ce qui est inférieur aux entités géographiques de référence (46,0 dans la Somme, 46,8 en Picardie et 48,4 en France métropolitaine).

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer colorectal est de 2,6 ‰ dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg (17 séjours en moyenne par an, dont 16 pour des hommes), contre 2,1 ‰ dans la Somme et 2,3 ‰ en Picardie.

De même, la mortalité par cancer colorectal est plus importante dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg (30,9 pour 100 000 en 2000-2004, soit 2 décès par an), qu'en Picardie (28,9) et qu'en France métropolitaine (27,8) et proche de celle observée dans la Somme (30,8).

Pour les **cancers des voies aérodigestives supérieures** (VADS), on dénombre 9 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an en 2004-2005. Ceci représente un taux de séjour de 1,6 ‰ (1,4 ‰ dans la Somme et 1,5 ‰ en Picardie).

L'aire a un taux de mortalité (20,2 pour 100 000) plus faible que dans la Somme (23,6) et la Picardie (22,2) mais plus élevé qu'en France métropolitaine (17,3). En 2000-2004, il s'agit de 1 décès par an en moyenne lié à cette cause dans l'aire.

En 2004-2005, 18 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire en moyenne par an sont liés à des **cancers de la trachée, des bronches et du poumon** (dont 9 pour des hommes), soit un taux de 3,0 séjours pour 1 000 habitants (2,5 ‰ dans la Somme et 2,8 ‰ en Picardie).

La mortalité liée à cette pathologie dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg (4 décès par an en moyenne entre 2000 et 2004) est supérieure à celle observée dans les entités géographiques de référence : 65,4 pour 100 000 contre 49,9 dans la Somme, 50,0 en Picardie et 44,0 en France métropolitaine.

→ Asthme

En 2006, 563 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (304 femmes et 259 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **13,7 % des assurés** de l'aire d'Hornoy-le-Bourg. Ce taux est supérieur à ceux de la Somme (11,1 %) et de la Picardie (10,3 %). Les taux féminins et masculins sont proches dans l'aire : 14,2 % des femmes et 13,2 % des hommes.

Les 0-12 ans sont 14,3 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg, soit 116 jeunes en 2006. Ce taux est également supérieur aux taux départemental (12,3 %) et régional (12,0 %). Les filles de l'aire sont moins concernées que les garçons : 11,5 % des filles (10,3 % dans la Somme et 10,1 % en Picardie) contre 16,7 % des garçons (14,2 % et 13,9 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.

→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Un taux d'admissions en ALD pour la maladie d'alzheimer et autres démences plus élevé



Le taux d'admissions en ALD pour **affections psychiatriques** de longue durée est inférieur dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg (92,3 pour 100 000 personnes, soit 5 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005) à ceux de la Somme (100,2), de la Picardie (131,9) et de la France métropolitaine (169,8).

En 2004-2005, 26 séjours hospitaliers pour troubles mentaux et comportementaux ont été enregistrés pour des habitants de l'aire en moyenne par an, soit un taux de 4,5 ‰ (5,3 ‰ dans la Somme et 7,5 ‰ en Picardie).

Concernant la **maladie d'Alzheimer** et autres démences (6 admissions en moyenne par an en 2004-2005, dont 4 femmes), l'aire d'Hornoy-le-Bourg a un taux plus élevé (100,5) que ceux du département (87,8), de la région (89,5) et du niveau national (86,2).

En 2006, 1,7 % des personnes de 70 ans et plus du régime général de l'aire d'Hornoy-le-Bourg ont eu une **prescription de médicaments anti-Alzheimer**, contre 2,8 % dans la Somme et la Picardie.

Dans cette aire, les femmes ont des taux plus élevés que les hommes : 2,1 % des femmes de 70 ans et plus contre 1,1 % des hommes (respectivement 3,0 % et 2,3 % dans la Somme et 3,2 % et 2,1 % en Picardie).



En 2006, 24,4 % des assurés sociaux du régime général ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope** (28,1 % des femmes et 20,3 % des hommes). Cette proportion est moins élevée que dans la Somme (26,3 %), et proche de la Picardie (24,1 %). Elle correspond à 951 personnes.

Les **anxiolytiques** ont été remboursés au moins une fois en 2006 à 16,7 % des assurés du régime général de l'aire (20,0 % des femmes et 12,8 % des hommes). Cette proportion est moins importante que celle de la Somme (18,1 %) et proche de la référence picarde (16,4 %).

Ceci correspond à 649 personnes remboursées pour un anxiolytique en 2006 dans l'aire.

La consommation d'**antidépresseurs** concerne 8,4 % des assurés de l'aire contre 8,8 % pour la Somme et 8,3 % pour la Picardie (11,1 % des femmes et 5,4 % des hommes, soit 330 personnes).

Pour les **neuroleptiques**, la proportion de personnes remboursées au moins une fois en 2006 est de 1,8 % (67 personnes), ce qui est proche des moyennes départementale et régionale.

Les consommations de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive, de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et de **traitement de la dépendance à l'alcool** concernent moins de 1 % des assurés de l'aire : respectivement 0,3 % (11 personnes), 0,1 % (5 personnes) et 0,4 % (15 personnes).

Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).


→ Prévention

Un taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein plus élevé qu'en Picardie et qu'en France

Durant la campagne de dépistage organisé du **cancer du sein** de 2005-2006, 413 mammographies ont été effectuées dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg auprès de femmes de 50-74 ans, soit une participation de 55,0 %.


Cette participation est forte au regard des chiffres enregistrés dans la Somme (52,7 %), la Picardie (45,5 %) et la France entière (47,1 %).

En 2006, 226 **frottis** ont été effectués sur des femmes de 25-64 ans de l'aire d'Hornoy-le-Bourg. Ceci représente un taux de dépistage de 20,6 %, ce qui est sensiblement identique à la Somme (20,1 %) et à la Picardie (20,8 %).



Dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg, 17,8 % des femmes ayant accouché ont bénéficié de **moins de 7 consultations prénatales** en 2000-2003. Ce pourcentage est plus élevé que dans la Somme (13,5 %) et la Picardie (15,7 %).

À l'inverse, le pourcentage de **prématurés** en 2000-2003 est moins élevé dans l'aire (2,4 %) que dans le département (5,4 %) et la région (5,6 %).



En 2006, 66,5 % des personnes de 65 ans et plus de l'aire d'Hornoy-le-Bourg sont **vaccinées contre la grippe**. Ce taux est plus élevé que celui observé en Picardie (64,9 %) et comparable à celui de la Somme (66,2 %).

La couverture vaccinale des femmes est proche de celle des hommes : 66,8 % des femmes de 65 ans et plus, contre 66,3 % des hommes.

Cette même année, les personnes en ALD âgées de moins de 65 ans sont 49,5 % à être vaccinées dans l'aire, avec une proportion plus importante chez les femmes : 56,8 % des femmes contre 44,4 % des hommes.

Les personnes en ALD de l'aire sont moins vaccinées que celles de la Somme (49,5 % contre 50,8 %), mais davantage vaccinées que celles de la Picardie (46,7 %).

En 2006, 73,7 % des enfants de deux ans de l'aire ont été vaccinés contre **la rougeole, les oreillons et la rubéole**, soit nettement moins que dans la Somme (85,0 %) et qu'en Picardie (89,2 %).

Concernant le **BCG**, l'aire a un taux de vaccination de 71,9 % des enfants de deux ans, ce qui est moins important que dans la Somme (77,4 %) et la Picardie (84,6 %).


Le taux de vaccination est de 89,5 % pour **la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite**. Ce taux est identique à celui de la Somme (89,5 %), mais inférieur à celui de la Picardie (91,3 %).

Enfin, la vaccination contre l'**hépatite B** est pratiquée à hauteur de 50,9 % des enfants de deux ans, contre 49,6 % dans la Somme et 52,7 % en Picardie.

Parmi les enfants de l'aire d'Hornoy-le-Bourg nés entre le 1^{er} août 1993 et le 31 juillet 1994, 39,2 % ont **consulté un dentiste, un chirurgien dentiste et/ou un stomatologue** l'année de leur 12 ans contre 38,8 % dans la Somme et 36,9 % en Picardie.

Ils sont 35,1 % à avoir subi une intervention (30,2 % dans la Somme et 27,4 % en Picardie) : 14 enfants ont eu des soins conservateurs (obturation, détartrage, attelle métallique, scellement prophylactique), 12 des actes de chirurgie et 15 des soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires



L'aire d'Hornoy-le-Bourg présente une population ayant un revenu annuel moyen inférieur à celui observé en Picardie.


Le taux de personnes ayant le RMI est moins important dans l'aire qu'en Picardie (rapport de 0,9), tandis que la part de chômeurs de longue durée est identique à celle observée en région.

La densité de logements sociaux est largement inférieure à la moyenne picarde (rapport de 0,2).

Enfin, les bénéficiaires de l'APA à domicile sont plus nombreux dans l'aire qu'en Picardie (rapport de 3,4), tandis que l'aire compte moins de bénéficiaires de l'aide ménagère (0,4).

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.

La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



La mortalité liée à l'appareil cardiovasculaire est moins importante dans l'aire d'Hornoy-le-Bourg qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (rapports de 0,7 et 0,8).

Par contre, le nombre d'admissions en ALD pour cette pathologie y est plus important (rapports de 1,2 et 1,4).

Le nombre d'admissions en ALD pour tumeurs est un peu moins élevé qu'en région et qu'au niveau national, tandis que le taux de mortalité par cancer se situe sous la moyenne régionale mais au-dessus du niveau national.

Globalement, les admissions en ALD sont plus nombreuses dans l'aire qu'en région et qu'en France métropolitaine. En revanche, la mortalité générale y est moins élevée.

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Le taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein est supérieur à celui de la Picardie (rapport de 1,2), tandis que le taux de dépistage du cancer du col de l'utérus est identique à celui retrouvé en région (1).

En ce qui concerne le ROR, la couverture vaccinale des enfants de 2 ans est beaucoup plus faible dans l'aire qu'en Picardie (rapport de 0,8). En revanche, la couverture vaccinale anti-grippale des personnes de 65 ans et plus est meilleure dans l'aire.

Enfin, les jeunes de 12 ans de l'aire sont plus nombreux à avoir consulté un dentiste (1,1) et à subir des soins dentaires (1,3).



Graphique polaire des préventions

Sources : Aisne Preventis, Adcaso, Adema 80, PMI des Conseils généraux 02, 60, 80, Urcam, Insee, OR2S

→ Analyse et spécificités de l'aire

Spécificités de l'aire

L'aire d'Hornoy-le-Bourg présente la particularité de posséder le taux de bénéficiaires de l'aide personnalisée à l'autonomie (APA) à domicile le plus élevé des aires picardes : 414,0 bénéficiaires pour 1 000 personnes de 75 ans et plus contre 117,7 ‰ en Picardie et 149,4 ‰ en France métropolitaine.

Ceci caractérise d'autant plus l'aire, qu'elle compte dans sa population une part importante de personnes âgées.

Globalement, le taux de personnes nouvellement admises en affection de longue durée est plus important dans l'aire, avec, en particulier, une prise en charge au titre de maladies cardiovasculaires plus élevée qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine : 732,2 pour 100 000 contre respectivement 602,0 et 586,1.

À l'inverse, la mortalité générale est moins élevée dans l'aire et les pathologies cardiovasculaires causent moins de décès (218,9 pour 100 000) qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (respectivement 314,2 et 271,8).

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

En 2004-2005, l'aire d'Hornoy-le-Bourg compte 120 nouveaux bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD) en moyenne par an, soit un taux d'admissions de 2 083,4 bénéficiaires pour 100 000 habitants. Ce taux est supérieur à ceux de la Somme (1 855,0), de la région (1 946,5) et du niveau national (1 877,1).

En 2000-2004, l'espérance de vie à la naissance est de 77,6 ans pour les hommes et de 82,1 ans pour les femmes.

Mortalité générale

En 2000-2004, l'aire d'Hornoy-le-Bourg connaît une mortalité générale (893,8 décès pour 100 000 habitants) moins forte qu'en Picardie (1 052,7) et qu'en France métropolitaine (911,3).

Maladies de l'appareil circulatoire

Ces maladies ont entraîné un taux de mortalité (218,9 pour 100 000) moins important qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (314,2 et 271,8) en 2000-2004.

Plus précisément, la mortalité par cardiopathies ischémiques (65,1 contre 86,6 en Picardie et 74,6 en France métropolitaine) et la mortalité par maladies vasculaires cérébrales (27,3 pour 100 000 contre 69,6 en Picardie et 63,4 en France métropolitaine) sont moins élevées qu'en région et qu'au niveau national.

Cancers

Les tumeurs provoquent une mortalité moins importante dans l'aire qu'en Picardie (269,2 décès pour 100 000 contre 286,6) mais plus importante qu'en France métropolitaine (257,8).

Le cancer de la prostate a entraîné l'admission en ALD de 6 hommes en moyenne par an entre 2004 et 2005, soit un taux de 244,3 pour 100 000 dans l'aire contre 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine. La mortalité est moins forte dans l'aire (34,5 pour 100 000) qu'en région et qu'en France métropolitaine (respectivement 53,8 et 45,1).

Le cancer colorectal présente un taux d'admissions en ALD plus faible que la Picardie et la France métropolitaine (39,5 pour 100 000 contre 46,8 et 48,4) mais une mortalité plus forte (30,9 décès pour 100 000 contre 28,9 et 27,8).

Enfin, pour le cancer du sein, le taux d'admissions en ALD atteint 177,3 pour 100 000 (contre 172,6 et 175,3) et le taux de mortalité s'élève à 22,9 décès pour 100 000 (contre 37,3 et 33,2).

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

L'aire d'Hornoy-le-Bourg se caractérise par un taux d'admissions en ALD pour la maladie d'Alzheimer et autres démences plus élevé qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (100,5 pour 100 000 habitants, contre respectivement 89,5 et 86,2).

Les assurés du régime général de l'aire sont aussi nombreux à avoir eu au moins un remboursement pour psychotropes qu'en région (24,4 % contre 24,1 %).

Prévention

Dépistages : le taux de dépistage organisé du cancer du sein (55,0 %) est plus élevé qu'en région (45,5 %) et le recours au frottis est sensiblement identique à celui observé en Picardie (20,6 % contre 20,8 %).

Périnatalité : le pourcentage de femmes ayant eu moins de 7 consultations prénatales est plus fort dans l'aire (17,8 %) qu'en Picardie (15,7 %).

Vaccination : les vaccinations anti-grippe chez les 65 ans et plus et chez les personnes en ALD de moins de 65 ans sont plus nombreuses dans l'aire qu'en région. En revanche, les vaccinations infantiles (ROR, BCG, DTCP, hépatite B) sont moins bien suivies qu'en région.

Actes dentaires : les enfants de 12 ans de l'aire d'Hornoy-le-Bourg sont davantage à avoir consulté un dentiste, et sont plus nombreux à avoir subi des soins dentaires, que les enfants picards.

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en décembre 2009
Il a été rédigé et mis en page par Christophe Pitel, Anne Ducamp,
Alexandra Fourquier, Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).